



## Gamaret Intramammary Suspension



در دمای زیر  $25^{\circ}\text{C}$  در جای خشک و دور از نور نگه داری شود.  
از یخ زدگی پرهیز شود و باقیمانده دارویی مصرف نگردد.

### موارد هشدار: ۱۲

افرادی که تزریق را انجام می دهند باید از تماس پوست و دهان با دارو جلوگیری کنند. در صورت تماس تصادفی لازم است که ناحیه با آب شسته شود.  
در افرادی که دارای حساسیت به پنی سیلین هستند توصیه می شود از تماس با دارو پرهیز کنند



شرکت هزار طب تهران  
سعادت آباد، علامه جنوبی، ساختمان توس، طبقه ۶، واحد ۱۱۰  
تلفن: ۸۸۶۹۲۸۲۸ (+۲۱)  
فاکس: ۸۸۶۹۰۸۰۸ (+۲۱)

۱. کمپانی سازنده بیوتا، جمهوری چک .  
وارد کننده ایرانی: شرکت هزار طب تهران
۲. سوسپانسیون داخل پستانی Gamaret
۳. هر اپلیکاتور شامل ۱۰ ml از سوسپانسیون روغنی سفید رنگ حاوی موارد ذیل :  
۱. پروکایین بنزیل پنی سیلیوم ۲. نئومیسین

Neomycin و Dihydrostreptomycin و Penicillin

می باشند .

۵. موارد منع مصرف: افزایش حساسیت به آنتی بیوتیک

پنی سیلین

۶. موارد هشدار: در بعضی موارد بعد از تزریق اول ممکن

است باعث افزایش حساسیت با علائم ترشح بزاق ،

روش مصرف: محل تزریق با آب ولرم با دقت شسته شده و سپس خشک گردد. نوک سینه ضد عفونی شود و بعد از برداشتن کاور پلاستیکی اپلیکاتور داخل مجرای نوک سینه قرار داده شود. بعد از تزریق محل تزریق ماساژ داده شود و در صورت نیاز بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت تکرار شود.



۳. دی هیدرو استرپتومیسین ۴. نووبیوسین
۵. پردنیزولون
۴. موارد مصرف: درمان التهاب پستانی حاد و مزمن در گاوها در دوره های شیردهی که منجر به عفونت به میکروارگانیزم هایی که حساس به Novobiocin و

تنگی نفس ، التهاب پوستی در ناحیه سر و پرینه شود.

۷. حیوان مکف: گاو شیرده

۸. دوز مصرفی: محتوی اپلیکاتور (۱۰ ml) از محلول آماده

مصرف می بایست در گارتیه ی درگیر بعد از تخلیه ی

شیر از پستان تزریق گردد.

۹. دستور العمل مصرف بیهیته: قبل از تزریق اپلیکاتور

تکان داده شود.

۱۰. طول دوره ی پرهیز از مصرف: گوشت: ۷ روز

شیر: ۷۲ ساعت

۱۱. موارد نگرانی: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.