

## برنامه صحیح واکسیناسیون در سگ و گربه

### واکسیناسیون در سگ

بسته به هر منطقه جغرافیایی و بنا به بیماری های شایع در آن منطقه برنامه واکسیناسیون نیز فرق میکند. دو نوع واکسن از لحاظ اهمیت وجود دارد:

واکسن های الزامی (که به آنها واکسن های هسته یا اصلی نیز میگویند): این واکسنها در تمام دنیا با یک برنامه و یکسان تزریق میشوند. واکسن های اصلی سگ شامل: ۱- دیستمبر ۲- هپاتیت ۳- پارانفولانزا ۴- پاروویروس ۵- لارنگوئیت عفونی ۶- هاری هستند. واکسنهای الزامی در گربه شامل ۱- کلسی ویروس ۲- هرپس ویروس ۳- پان لوکوپنی ۴- هاری میباشند. همچنان که از اسمشان پیداست تزریق واکسن های اصلی برای تمام سگ ها و گربه ها الزامی است.

واکسنهای اختیاری (که به آنها غیر هسته یا غیر اصلی نیز میگویند): یعنی این واکسنها بنا بر صلاحدید دامپزشک بر اساس بیماری های شایع آن منطقه تزریق میشوند. مثل لپتوسپیروز در سگ یا ایدز در گربه

### زمان تزریق در سگ

سگهایی که وقتی به دامپزشک آورده میشوند کمتر از ۱۶ هفته (۴ ماه) سن دارند.

سگهایی که وقتی به دامپزشک آورده میشوند بیشتر از ۱۶ هفته سن دارند.

اگر شما سگی دارید که کمتر از ۱۶ هفته سن دارد: واکسن های الزامی (بجز هاری میبایست) اولین تزریقش در ۶-۸ هفتهگی باشد و تزریق بعدی ۹-۱۱ هفتهگی و بعدی ۱۲-۱۶ هفتهگی انجام بگیرد. در نژاد های مستعد به پاروویروس مثل ژرمن شپرد و روتوایلر دوز چهارم بعد از آخرین واکسن نیز توصیه میشود. بنابراین تا پایان چهار ماهگی حداقل سه بار میبایست واکسن های الزامی تکرار شوند. اگر ما بین این تزریقها وقفه بیفتد امکان ابتلا به بیماری وجود دارد. بعد از آخرین تزریق تا یکسال پس از آن تزریقی لازم نیست. یکسال بعد تزریق یادآوری یا همان بوستر انجام میشود. اگر شما سگی دارید که بیشتر از ۱۶ هفته سن دارد و تا حالا واکسن نخورده یا نمیدانید آیا واکسن خورده است: یک دوز واکسن الزامی (بجز هاری) در اولین مراجعه و ۳-۴ هفته بعد از آن تکرار شود. یادآوری ها ۱ سال بعد تکرار می شود.



نکته ۱: بر روی بروشور واکسن ها توصیه شده که هر سال واکسیناسیون تمدید شود.

نکته ۲: واکسن کرونا ویروس جز واکسن های اختیاری است که برای مدتی نیز در ایران تزریق میشد. جالب است بدانید کتابهای مرجع دامپزشکی هیچ کدام تزریق این واکسن را پیشنهاد نمیکنند.

نکته ۳: قبل از اولین واکسیناسیون اصلی و تا ۴-۵ روز بعد از آن توله را بیرون نبرید و یا با سگهای غریبه در ارتباط نگذارید.



## واکسیناسیون در گربه

همانند سگ واکسن های گربه نیز از نظر اهمیت به دو نوع تقسیم میشوند ۱- واکسن های الزامی ۲- واکسن های اختیاری



واکسن های الزامی گربه شامل ۱- هرپس ویروس ۲- کلسی ویروس ۳- پان لوکوپنی ۴- هاری میباشند. معمولاً سه واکسن اول در یک ویال قرار دارند که به آن واکسن ۳ گانه میگویند. از واکسن های اختیاری در گربه میتوان به FeLV-FIV و کلامیدیا اشاره کرد.

- اگر گربه ای که به دامپزشکی آورده میشود کمتر از ۱۶ هفته (۴ ماه) سن داشت می بایست از سن ۶ هفتهگی واکسن ۳ گانه تزریق و بعد از آن هر ۳-۴ هفته یکبار تا سن ۱۶ هفتهگی تکرار شود. این یعنی تا سن ۱۶ هفتهگی به بچه گربه ۳ بار واکسن ۳ گانه تزریق شود. یکسال بعد از آخرین تزریق یک تزریق یادآوری و بعد از آن هر سال یکبار تزریق انجام شود.
- اگر گربه ای که به دامپزشکی آورده میشود بیشتر از ۱۶ هفته سن داشت میبایست دو دوز واکسن ۳ گانه به فاصله ۳-۴ هفته تزریق و سپس یک سال بعد یک تزریق یادآوری و بعد از آن هر سال یکبار دریافت کند.



هاری نیز میبایست در سن ۱۲ هفتگی یکبار و بعد از آن هر سال تزریق تکرار شود. وانگاه یادآور هر سال یکبار میشود.





با انجام واکسیناسیون به موقع و روزآمد برای حیوانات از ابتلا او به بیماری‌های خطرناک پیشگیری کنید و به حفظ سلامتی حیوانات کمک کنید. هزینه پیشگیری بیماری یقیناً کمتر از هزینه های درمان بیماری خواهد بود.

این در حالی است که می توان درباره معایب واکسیناسیون نکاتی را ذکر کرد. واکسیناسیون ممکن است موجب بروز حساسیت در حیوان شود. این حساسیت می تواند شامل تب و بی حالی یک روزه تا شوک و احتمال مرگ حیوان شود که البته با مراقبتهای به موقع می توان میزان خطر را پایین آورد.

اگر مزایا و معایب واکسیناسیون را در دو کفه ترازو قرار دهیم. مزایای آن خیلی بیشتر از معایب آن خواهد بود. پس توصیه می کنیم به خاطر ترس از خطرات احتمالی واکسیناسیون این امر مهم را نادیده نگیرید و برای واکسیناسیون حیوانات به دامپزشک مراجعه نمایید.

پیشنهاد می کنیم برای واکسیناسیون حیوانات با دامپزشک درباره فواید و ریسک های واکسیناسیون صحبت کنید.



<http://aranvet.com>